



EFFECTIVIDAD DE QUTENZA® EN DOLOR NEUROPÁTICO CRÓNICO. A PROPÓSITO DE UN CASO.

M^o Rosario García Liendo, Alaitz Urriaga Urrestizala, Garazi Unzueta García, Carmen Marcos De Prado, Naiara Pérez Vila, Maider Silva Vivanco, Pablo Renedo Corcostegui
Hospital Universitario Basurto

INTRODUCCIÓN

El dolor neuropático se percibe como quemazón, hormigueo o hipersensibilidad al roce o al frío. El parche de Capsaicina al 8% (Qutenza®) es un parche adhesivo que contiene una alta concentración de capsaicina sintética. Está aprobado para el tratamiento del dolor neuropático periférico en adultos, ya sea solo o en combinación con otros medicamentos para el dolor.



DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer, 56 años, sin antecedentes de interés.

- Año 1991: dolor en la parte posterior de la rodilla, valorada por Traumatología y tras pruebas complementarias se sospecha neurinoma a nivel ciático-poplíteo externo → IQ para exploración y liberación del nervio.

A pesar de la IQ el dolor persiste y es derivada a Rehabilitación: ejercicios de fisioterapia combinados con ultrasonidos en la zona de la cicatriz, sin nada de mejoría.



Durante los 8 años siguientes es valorada en la Unidad del Dolor de otro hospital tratándose con Paracetamol, Ibuprofeno, Tapentadol, Pregabalina, Paroxetina y Duloxetina, sin eficacia. Realizados múltiples electromiogramas durante esos años sin objetivar hallazgos patológicos.

- Año 2012: acude a nuestra Unidad refiriendo dolor en EID localizado en la parte posterior de la rodilla con irradiación tanto a la parte posterior de muslo como al gemelo derecho. Así como alodinia e hiperestesia sobre el área cicatricial.

Se comienza tratamiento con Gabapentina 100mg/8 horas + parche de Qutenza.

Tras la primera aplicación refiere mejoría completa del dolor, por lo que, se decide aplicar parche de Qutenza cada 3 meses. El tiempo de aplicación es de 1 hora y no precisa de medidas analgésicas, hielo o medicación para su aplicación. A la semana de la aplicación se realiza una consulta telefónica por parte de una enfermera de la unidad para valorar la eficacia.

Durante todos estos años, se han realizado un total de 38 aplicaciones, siendo la mejoría del dolor de entre el 70 y el 90% tras cada aplicación, hay tras aplicaciones que incluso el dolor ha desaparecido, con gran satisfacción por parte de la paciente.



CONCLUSIONES

La aplicación de parche de Qutenza® es una alternativa al tratamiento del dolor neuropático. Aplicaciones repetidas no pierden eficacia en el tratamiento del mismo, son seguras y bien toleradas.

BIBLIOGRAFÍA

- Derry S, Rice ASC, Cole P, Tan T, Moore RA. Topical capsaicin (high concentration) for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD007393. DOI: 10.1002/14651858.CD007393.pub4.
 - López M, López J, López J, García M. Uso de parches de capsaicina al 8 % para el tratamiento del dolor neuropático lumbar. Rev Soc Esp Dolor 2022;29(1): 28-33 / DOI: 1020986/reesd20223995/2022