



# Consumo aberrante de opioides detectado por la unidad de dolor en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

L. Garcarena<sup>1</sup>, S. Mohamed<sup>1</sup>, R. García<sup>1</sup>, I. Martínez<sup>1</sup>, J. Hernández<sup>1</sup>, G. Peña<sup>2</sup>, C. Horas<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Médico residente 2º año, Servicio de Anestesiología y reanimación, Unidad de dolor, Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; <sup>2</sup> Facultativo especialista de área, Servicio de Anestesiología y reanimación, Unidad de dolor, Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

## INTRODUCCIÓN

Actualmente los analgésicos opioides son uno de los ejes en la terapéutica del dolor. Pese a la regulación en su prescripción, se producen situaciones de consumo aberrante. Es importante determinar los factores de riesgo que conduzcan a conductas aberrantes en el paciente con dolor crónico y así evitar el uso indebido y la adicción a estos fármacos, ya que podría considerarse un acto iatrogénico.


## OBJETIVOS

Conocer el perfil del paciente con dolor crónico con consumo aberrante de opioides en la unidad de dolor del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

## MATERIALES & MÉTODOS



## RESULTADOS



## CONCLUSIONES

- ❖ Estrecha asociación del dolor con la patología tratada en la unidad de salud mental
- ❖ Abundancia de pacientes con dolor en relación con columna vertebral
- ❖ Se destaca el abuso de opioides mayores
- ❖ El estudio está limitado por el tamaño muestral
- ❖ No se pudo ver que la muestra de nuestro centro se correspondía con las propuestas sociodemográficas más prevalentes en pacientes con mayor riesgo de abuso o adicción a analgésicos opioides

## BIBLIOGRAFÍA

•Els C, Jackson TD, Kunyk D, Lappi VG, Sonnenberg B, Hagtvedt R, et al. Adverse events associated with medium- and long-term use of opioids for chronic non-cancer pain: an overview of Cochrane Reviews. En: The Cochrane Library [Internet]. John Wiley & Sons, Ltd; 2017 [citado 20 de febrero de 2018]. Disponible en: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012509.pub2/abstract> Salazar A, Moreno S, Sola HD, Moral-Munoz JA, Dueñas M, Failde I. The evolution of opioid-related mortality and potential years of life lost in Spain from 2008 to 2017: differences between Spain and the United States. Curr Med Res Opin. 1 de febrero de 2020;36(2):285-91. Utilización de medicamentos opioides en España durante el periodo 2010-2018 [Internet]. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [citado 28 de julio de 2020]. Disponible en: <https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-usohumano/observatorio-de-usode-medicamentos/utilizacion-de-medicamentos-opioidesen-espana-durante-elperiodo-2010-2018>