



## USO DE PARCHES DE CAPSAICINA AL 8% PARA TRATAMIENTO DEL DOLOR DE MIEMBRO FANTASMA

Yanguas P., Murillo M., Del Pozo E., Borobia E., Carbajo E.

### INTRODUCCION

El dolor de miembro fantasma puede ocurrir hasta en el 80% de los sujetos con amputación. Es un dolor de origen neuropático. En este tipo de lesiones es posible que en el muñón haya una concentración alta de receptores TRPV1.

La capsaicina se comporta como un agonista reversible del receptor vaniloide (TRPV1) por lo que su indicación terapéutica es de primera elección en el dolor neuropático.

### MOTIVO DE CONSULTA


Varón de 69 años que en 2019 acude a nuestra Unidad del dolor derivado por su médico de AP con dolor de miembro fantasma en extremidad inferior derecha, de varios años de evolución tras amputación traumática por accidente de tráfico en 1977. El paciente refiere haber sido previamente tratado en otras Unidades del Dolor con parches de capsaicina hasta en 4 ocasiones.

### ANTECEDENTES PERSONALES

- Diabetes mellitus tipo 2, Esófago de Barrett, hipertiroidismo.
- Alergias: Tiomersal.
- Intervenciones quirúrgicas: amputación traumática de extremidad inferior derecha, hernia discal cervical.
- Tratamiento para el dolor: Pregabalina 25mg mañana y 150 mg noche; Amitriptilina 25 mg noche y Tramadol/Paracetamol si precisa

### CUADRO CLINICO

- 1ª consulta en nuestra unidad en octubre de 2019: refiere EVA 9/10, por lo que se procede a la primera aplicación de parche de capsaicina al 8%. Revisión telefónica al mes: notable mejoría (EVA 3/10).
- 2º parche en mayo de 2020 (EVA 7/10). Revisión telefónica al mes: notable mejoría (EVA 4/10).
- 3º parche en marzo de 2021 (EVA 8/10). Revisión telefónica al mes: notable mejoría (EVA 3/10).
- En enero 2024, el paciente vuelve a contactar con la Unidad por intenso dolor (EVA9/10), logrando esta vez al mes una mejoría del casi 100% (EVA 0/10).



### CONCLUSIONES

Hemos comprobado que el tratamiento con parche de capsaicina al 8% produce alivio del dolor neuropático en el miembro fantasma, con la ventaja de poder disminuir la medicación oral y por tanto sus efectos adversos (en la actualidad el tratamiento es Amitriptilina 25mg por la noche y Paracetamol de rescate) y mejorando la calidad de vida del paciente.